











































ESQUEMA IDEAL DE VACUNACIÓN

0 a 9 Años de Edad

Realizado por:  Asociación Mexicana de Vacunología

www.vacunacion.org
@vacunologia 




Vacuna		Al nacer	2 meses	4 meses	6 meses	7 meses	9 meses	12 meses	18 meses	2 años	4-6 años	Anual
BCG ¹												
Virus Sincitial Respiratorio (VSR) ²												
Hepatitis B												
Polio inactiva												
H. Influenzae												
DPaT												
Rotavirus	Monovalente											
	Pentavalente											
Neumococo conjugada												
Virus de influenza												
COVID - 19 ARNm ³												
Sarampión, Rubéola, Parotiditis												
Varicela												
Hepatitis A												
Meningococo ACYW												
Neumococo Polisacáridos ⁴												

1. Se recomienda aplicar al recién nacido de 34 semanas de gestación en adelante.

2. Prevención con inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales, administrada una dosis única durante el periodo de riesgo de VSR.

3. Esquema inicial de 2 o 3 dosis dependiendo del producto que se utilice.

4. Se recomienda a personas con enfermedades específicas.

 **Vacuna hexavalente:** Las vacunas de este color corresponden a la vacuna hexavalente.